

⚠ 使用上の注意**相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位(痔出血に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

月経不順、月経困難、月経痛、腰痛、痔出血、脱肛^{a)}、妊娠中の浮腫^{b)}、痔疾、ヒステリー、更年期神経症^{c)}

- a)脱肛：で痔のことを示します。
 b)浮腫：むくみのことを示します。
 c)更年期神経症：更年期に起こる神経症のことを示します。

用法・用量

次の量を随時^{注)}、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「随時服用」とは食前・食間(食後2～3時間)・食後のいつ服用してもよいことを指しますが、胃腸の弱い方は食後の服用がよいでしょう。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	5 錠	3 回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤15錠(3.3g)中

オウギ	0.563g	カンゾウ	0.563g	} エキス…2.68mL(固形物として0.75g)
ケイヒ	0.188g	シャクヤク	0.75g	
シヨウキヨウ	0.188g	センキュウ	0.563g	
タイソウ	0.563g	タクシャ	0.75g	
トウキ	0.75g	ビャクジュツ	0.563g	
ブクリョウ	0.563g			
カンゾウ末	…0.375g			
ケイヒ末	…0.375g			
センキュウ末	…0.225g			
ビャクジュツ末	…0.525g			
ブクリョウ末	…0.75g			

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖を含有する。

- ・本剤は淡黄褐色で、特異なおいを有し、味はわずかに苦い錠剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

薬と養生

フラーリンQ錠は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤や養生方法のことをご理解いただいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号