

十一味敗因散®

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師の診察を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばり に加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に 強くなる。

- 1ヵ月位(化膿性皮膚病に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合
は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を
中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

癬^{a)}、癬^{b)}、頭瘡^{c)}、その他化膿性皮膚病、にきび、湿疹、じんましん、水虫

- 癬：患部が狭いおできのことを示します。
- 癬：癬が集まって患部が広がったおできのことを示します。
- 頭瘡：頭部にできる湿疹・おできのことを示します。

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回量		1 日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大 人	1.5g(添付のサジ1杯)	1 包	3 回
12歳以上15歳未満	大人の2/3の量(1.0 g)	2/3包	
7歳以上12歳未満	大人の1/2の量(0.75g)	1/2包	
4歳以上 7歳未満	大人の1/3の量(0.5 g)	1/3包	
4 歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

キ ジ ツ……0.369g シャクヤク……0.369g	} エキス……1.899mL (固形物として0.074g)	カンゾウ末……1.107g シヨウキヨウ末……0.590g ブクリヨウ末……1.622g
キキョウ……1.844g ケイガイ……0.369g サイコ……0.369g センキュウ……0.369g ボウフウ……1.107g レンギョウ……1.107g オウヒ……0.369g ドクカツ……0.369g		} エキス……2.800mL (固形物として1.107g)

- ・本剤は淡黄褐色で、特異なおいを有し、味は初め辛く後わずかに甘い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

十一味敗因散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号